

۱. قبل از ریختن قطره دست‌ها به خوبی شسته شود و درب قطره همان طوری باز شود که داخل درب و نوک قطره هیچ تماسی با دست یا چشم نداشته باشد.
۲. برای ریختن قطره در چشم بهتر است بیمار به حال دراز کش بخوابد یا در حال نشسته سر خود را کاملاً بالا گرفته و به سقف یا آسمان نگاه کند.
۳. پلک پایین را به آرامی به طرف پایین کشیده و ۱ تا ۲ قطره در محوطه داخل پلک ریخته شود و چشم بدون فشار به آرامی بسته شود و مدت ۱ دقیقه برای اثر بهتر قطره بسته بماند.
۴. در صورتی که زمان ریختن دو یا چند قطره همزمان گردید بایستی بین ریختن قطره‌ها حداقل ۱۰ دقیقه فاصله داده شود.
۵. در صورت جمع شدن ترشح یا کثیف شدن پلک و اطراف چشم با پنبه تمیز خیس شده با آب ولرم به آرامی تمیز گردد.
۶. محافظ چشمی به مدت ۳ روز به طور مداوم باید روی چشم باشد و فقط موقع ریختن قطره‌ها از روی چشم برداشته شود. پس از ۳ روز بیمار می‌تواند در ساعاتی که در منزل است آن را بردارد ولی تا یک هفته بعد از آن بایستی در موقع خارج شدن از منزل در آفتاب، گردو خاک و موقع خواب (برای جلوگیری از تماس چشم با بالش یا اصابت غیر ارادی دست و...) روی چشم گذاشته شود.
۷. تا ۳ روز از برداشتن اجسام سنگین و خم شدن به جلو خودداری گردد.
۸. تا ۳ روز بعد از عمل از شستن چشم و استحمام باید خودداری شود. در صورت جمع شدن ترشحات فقط با پنبه خیس قبل از هر نوبت ریختن قطره، پلک‌ها تمیز گردد. (بدون وارد کردن فشار)
۹. زمان معاینه مجدد پس از ترخیص از بیمارستان بر عهده پزشک معالج است و حداقل یک هفته بعد از عمل و یک ماه بعد از آن انجام می‌گیرد.
۱۰. ریختن قطره‌ها طبق دستور جراح تا توصیه وی ادامه یابد.
۱۱. حساسیت به نور آفتاب و ترس از نور تا حدودی طبیعی است. در صورت پیدایش درد و تاری شدید، قرمزی بیش از معمول در هر زمان فوراً به جراح خود یا اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.