

۱. عمل جراحی جهت اصلاح پتوز بر روی عضله پلک انجام می شود و گاهی نیز با استفاده از غلاف عضلانی ناحیه ران و یا مواد مصنوعی می باشد.
۲. بعد از عمل جراحی پتوز اغلب نیاز به بستری شدن وجود ندارد.
۳. پانسمان چشم روز بعد از عمل برداشته می شود و بر حسب معاینه چشم، ممکن است روز اول تا سوم چشم پانسمان شود. ولی بعد از این زمان به پانسمان یا شیلد (محافظ پلاستیکی) نیازی نیست.
۴. نماز خواندن از همان روز عمل با تیمم بلامانع است. (سجده کردن نیز مانعی ندارد)
۵. در عمل جراحی پتوز سه نوع بخیه روی پلک داریم: یکی معمولاً "روز بعد از عمل برداشته می شود. یک سری انتهای هفته اول و سری دیگر انتهای هفته دوم بعد از عمل برداشته می شوند.
۶. در تاریخ های ذکر شده جهت معاینه به طور دقیق مراجعه کنید.
۷. زمان حمام کردن را از پزشک خود سوال کنید. ولی معمولاً از روز دوم به بعد می توانید حمام کنید.
۸. مطالعه، تماشای تلویزیون و فعالیت های عادی زندگی از روز بعد از عمل بلامانع است. خوابیدن به سمت چشم عمل شده نیز مانعی ندارد.
۹. در روزهای بعد از عمل در صورتی که دچار کاهش دید چشم، قرمزی، حساسیت به نور یا درد دائمی چشم شدید به پزشک خود مراجعه کنید. در صورت عدم دسترسی به جراح خود به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
۱۰. تاریخ عمل را به یاد داشته باشید و در هر مراجعه بیان کنید.
۱۱. از روز بعد از عمل مسافرت با هواپیما یا هر وسیله ای دیگر بلامانع است.
۱۲. در جراحی پتوز، اغلب تا مدتی چشم اندکی باز می ماند. که بایستی شب ها با مصرف پماد، جلوی خشک شدن چشم گرفته شود. که معمولاً "پس از چند ماه چشم با شرایط فوق سازگار شده و نیاز به مصرف پماد نیست.
۱۳. بعد از عمل پتوز، در نگاه به پایین سفیدی چشم بیشتر از طرف مقابل دیده می شود که یکی از عوارض اجتناب ناپذیر عمل است و باید از قبل در مورد آن تصمیم گرفت.

۱۴. در عمل جراحی پتوز گاهی لازم است عمل در هر دو چشم صورت گیرد (درحالیکه به نظر شما علائم بیماری یک طرفه است).

۱۵. مصرف قطره های چشمی باید حداکثر تا یک ماه پس از عمل ادامه یابد. طرز مصرف قطره و پماد را از پزشک خود سوال کنید. در هر مراجعه داروهای مصرفی را با خود بیاورید و نام آنها را یاد بگیرید. از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.