

استرابیسم ( لوچی چشم) :

یکی از شایع ترین مشکلات چشم به خصوص در کودکان است که اگر در دوران کودکی درمان نشود، به اختلال دید دائمی منجر می شود.

استرابیسم دو نوع دارد: انحراف داخلی چشم که "ایزوتروپی" نام دارد و انحراف خارجی که "آگزوتروپی" نامیده می شود.

### مراقبت های بعد از عمل چشمی استرابیسم :

عمل جراحی استرابیسم روی عضلات اطراف کره چشم انجام می شود و در ظاهر بجز قرمزی چشمها علائمی از عمل جراحی دیده نمی شود . بعد از اغلب جراحی ها، نیازبه بستری شدن وجود ندارد. به جز موارد نادر بعد از عمل پانسمان نیاز نمی باشد در ضمن حرکت بیمار بعد از عمل مثل راه رفتن و غیره بلا مانع است .

در ساعات اولیه بعد از عمل ممکن است قطراتی خونابه از چشم جاری شود که این موضوع باعث نگرانی نمی باشد. در تاریخ های تعیین شده جهت معاینه مراجعه کنید و در هر مراجعه داروی مصرفی خود را همراه خود بیاورید.

دقت کنید برچسب روی داروها کنده نشود. طرز مصرف قطره های و پمادها را حتماً از پزشک خود سؤال کنید. سعی کنید قطره ها را در زمانهای تعیین شده مصرف کنید در فواصل خواب نیاز به ریختن قطره نمی باشد ولی بهتر است این مساله را از پزشک خود سؤال کنید .

استرابیسم کودکان در صورتی که به موقع درمان نشود، کاهش دید یا آمبلیوپی (تنبلی چشم) را به همراه خواهد داشت.

مهم ترین راه پیشگیری از چنین عارضه ای معاینه چشم در طول دوره شیرخواری و سنین قبل از مدرسه است. در غیر این صورت با پیشرفت بیماری تنها جراحی است که می تواند کودک را از خطر کاهش دید نجات دهد.

آمبلیوپی را می توان با بستن چشم بهتر و تقویت و با بهبود بینایی چشم ضعیف تر، درمان نمود.

اگر آمبلیوپی در همان سالهای نخست زندگی تشخیص داده شود، درمان آن اغلب موفقیت آمیز خواهد بود ولی در صورتیکه درمان آن به تاخیر افتد، آمبلیوپی یا آفت دید وضعیتی دائمی پیدا خواهد کرد.